

El Ciruelo en Flor

(*Prunus cerasifera*) Ehrhart



El ciruelo en flor, oriundo del oeste de Asia, en la región del Cáucaso, pertenece a la familia de las rosáceas, la que agrupa a más de 2.000 especies que se distribuyen en todos los rincones del orbe. Esta familia incluye especies nativas en un número cercano a las 55, repartidas en 16 géneros.

Desde los albores de la civilización, la familia de las rosáceas ha tenido una importancia gravitante para el hombre, pues muchas de sus especies proveían frutas, algunas de las cuales, tras una selección genética de milenios, aún consumimos en forma habitual, tales como manzanas, peras, membrillos, duraznos, damascos, ciruelas, cerezas, guindas, almendras, nísperos, níscolas, frambuesas y frutillas, además de frutas silvestres como moras y mosquetas, entre muchas otras. Igualmente, esta familia nos provee de árboles de ornato y de flores de extraordinaria belleza, como las rosas.

El nombre científico *Prunus* se refiere al nombre latino de las ciruelas, y la denominación de *cerasifera* tiene relación con que es portador de "cerezas", sus pequeños frutos. Cabe señalar que el género *Prunus* agrupa a cerca de 400 especies.


El ciruelo en flor, una apreciada y valiosa especie ornamental, corresponde a un arbolito que no suele alcanzar y menos sobrepasar los 7 metros de altura. La corteza es pardo purpúrea, con fisuras horizontales más claras. Las hojas son alternas, caducas, ovaladas, de hasta 6 cms. de largo, con el margen aserrado o dentado, y su colorido depende de la variedad de que se trate. Las flores, pequeñas, alcanzan un tamaño de hasta 2,5 cms. de diámetro y presentan un color rosado o blanco, con 5 pétalos y numerosos estambres. El fruto se identifica por ser una drupa rojiza o amarillenta que mide unos 2,5 cms. de diámetro. Madura en el verano y es comestible, aunque algo insípida.

Se puede multiplicar por semillas o por esquejes. Las plantas producidas se injertan con la variedad deseada. Los ejemplares injertados soportan mejor tanto las inclemencias climáticas como los suelos pobres, requiriendo siempre, eso sí, de un cierto grado de humedad.

Su cualidad ornamental está dada en gran medida por su follaje, de color verde o rojo oscuro a púrpura, por su copa amplia y redondeada y por su abundante floración que reviste las ramas desnudas, ya que las flores anteceden a la aparición del follaje.

La especie originaria es de flores blancas y hojas verde oscuro y se la conoce como variedad *cerasifera*. De ella han derivado otras tres variedades:

- Variedad *pissardii*: de hojas purpúreas y botones florales rosados que dan origen a flores blancas.
- Variedad *rosea*: de hojas pequeñas de color purpúreo rojizas y flores rosadas.
- Variedad *nigra*: hojas grandes de color purpúreo oscuras y flores rosadas.



Texto & Fotos
Iván Benoit Contesse - Biólogo, CONAF

El Ciruelo en Flor es un arbolito que no suele alcanzar y menos sobrepasar los 7 mts. de altura